

p135

**Levetiracetam experiencia de uso en población colombiana /
Experience of Levetiracetam use in a Colombian population**

Cifuentes Monje L¹, Medina-Malo C², Carreño O³, Cruz S⁴, Obando M⁵, Ruiz N⁶, Fandiño J²

1) Universidad De Los Andes, Bogotá, Colombia, 2) Liga Colombiana Contra La Epilepsia, Bogotá, Colombia, 3) Hospital Universitario Medellín, Medellín, Colombia, 4) Fundación Valle Del Lili, Cali, Colombia, 5) Hospital Universitario Armenia, Armenia, Colombia, 6) Hospital Universitario Bucaramanga

Objetivo: Evaluar la efectividad y seguridad de levetiracetam en Colombia como terapia coadyuvante en crisis parcial con o sin generalización secundaria.

Metodología: Estudio observacional, multicéntrico, tipo cohorte única, abierto y prospectivo, consistente en 16 semanas de seguimiento.

Resultado: Ciento trece pacientes mayores de 10 años, fueron evaluados, 48.6% mujeres y 51.4% hombres, con edad promedio de 24 años (\pm 18 años). La dosis promedio fue de 2.000 mg/día (95% IC: 1.000-3.000 mg). Crisis focal 88% y generalizada 12%. Número de crisis día: (frecuencia de 0 a1) al inicio fue de 44.2% y al finalizar fue de 54.8%, (frecuencia > 8) al inicio fue de 15.9% y al finalizar fue de 0%. Números días libre de enfermedad (> 6) al inicio fue de 36.2% y al finalizar fue de 48.7%. No se reportaron efectos adversos.

Conclusión: Levetiracetam terapia coadyuvante a la dosis promedio de 2.000 mg / día es efectivo y bien tolerado en pacientes con crisis parcial con o sin generalización secundaria.